

ASSOCIATION ESPOIR DE NOISETTE

Soutien aux malades atteints des
syndromes de compressions vasculaires
Nutcracker, Cockett, Wilkie et Dunbar

Association loi 1901 reconnue d'intérêt général, Espoir de Noisette a été fondée dans le but de soutenir, informer, sensibiliser et participer à l'amélioration des parcours de soins et de la prise en charge des malades atteints des syndromes de compressions vasculaires Nutcracker, Cockett/May-Turner, Wilkie et Dunbar, notamment en soutenant la recherche médicale.

Les syndromes de compressions vasculaires sont des maladies rares, reconnues et référencées par Orphanet, qui peuvent impacter lourdement la qualité de vie des malades qui en sont atteints.

Le syndrome de Nutcracker (Casse-Noisette)

Définition

Compression de la veine rénale gauche entre l'aorte et l'artère mésentérique supérieure (et dans de rares cas entre l'aorte et les vertèbres)

Principaux symptômes

Vive douleur du flanc et du rein gauches, varices pelviennes, douleurs abdominales, sous-costales et lombaires, nausées, vomissements, troubles digestifs, vertiges, tachycardie, hypotension, intolérance à l'effort, fatigue, malaises, douleurs dans les jambes, sang dans les urines, infections urinaires.

Le syndrome de Wilkie (Artère Mésentérique Supérieure)

Définition

Compression extrinsèque de la troisième portion du duodénum entre l'aorte et l'artère mésentérique supérieure

Principaux symptômes

Douleurs abdominales et épigastriques sévères, douleurs, nausées et vomissements après les repas, difficulté importante à s'alimenter, sensation de satiété précoce, dénutrition, gastroparésie, amaigrissement, vertiges, tachycardie, fatigue, malaises, intolérance à l'effort.

Le syndrome de Dunbar (Ligament Arqué Médian)

Définition

Compression du tronc cœliaque par le ligament arqué médian du diaphragme

Principaux symptômes

Douleurs abdominales et épigastriques diffuses, gêne ou pression au niveau du diaphragme ou de la poitrine, essoufflement, difficulté à respirer, nausées, vomissements, douleurs et diarrhées après les repas, constipation, vertiges, tachycardie, malaises, fatigue, intolérance à l'effort.

Le syndrome de Cockett (May-Turner)

Définition

Compression de la veine iliaque commune gauche par l'artère iliaque primitive droite contre les vertèbres lombaires.

Principaux symptômes

Varices pelviennes et des membres inférieurs, douleurs abdominales, pelviennes et lombaires, douleurs irradiant dans l'aîne et la cuisse gauches, douleurs, engourdissement et gonflement des jambes, difficulté à la marche, œdèmes, risque accru de phlébite et d'embolie pulmonaire.